

Badanie USG jamy brzusznej / układu moczowego

Obecne w przewodzie pokarmowym gazy jelitowe oraz treści pokarmowe mogą znacznie zaburzyć możliwość dokładnej i pełnej oceny narządów jamy brzusznej. Aby pomóc Państwu w prawidłowym przygotowaniu do badania, zalecamy następujące kroki:

- ❖ Przynajmniej 6 godzin przed rozpoczęciem badania nie należy spożywać pokarmów.
- ❖ W dniu poprzedzającym badanie należy spożywać posiłki lekkie:
 - pozbawione warzyw strączkowych,
 - soków owocowych,
 - owoców,
 - słodczy.
- ❖ 2 dni przed badaniem rekomendujemy przyjmowanie środków zmniejszających produkcję gazów jelitowych (np. Espumisan) w dawce zgodnej z ulotką leku.
[lek dostępny bez recepty w aptekach.](#)
- ❖ W dniu badania zalecamy wypicie niewielkiej ilości niegazowanej wody, tak, aby podczas badania pęcherz moczowy był wypełniony. Odradzamy jednak picia wody tuż przed badaniem (najlepiej zaprzestać picia około godzinę przed badaniem).
- ❖ Prosimy zabrać ze sobą poprzednie wyniki badań jamy brzusznej (o ile takowe posiadają Państwo).
- ✚ Szczególnie ważne jest, aby pęcherz moczowy podczas badania układu moczowego był możliwie maksymalnie wypełniony – jest to jedyna różnica w stosunku do badania jamy brzusznej.